

Ergänzungsfuttermittel für Rinder

D

Zusammensetzung: Hefe (inaktive *Saccharomyces cerevisiae*), Getreideschlempe (getrocknet), Sojaöl

Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 18,71 %, Rohfett 4,33 %, Rohfaser 1,51 %, Rohasche 48,08 %, HCl-unlösliche Asche 40,15 %, Natrium 0,05 %, Phosphor 0 %

Zusatzstoffe je kg: Darmflorastabilisatoren:
4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10⁹ KBE
Stoffe zur Verringerung der Kontamination von Futtermitteln mit Mykotoxinen: 1m558* Bentonit 500 000 mg
Aromastoffe: Mischung aus Aromastoffen** 10 000 mg

Fütterungshinweis:

Milchkühe: 20 g je Tier und Tag
Mastrinder: 35 g je Tier und Tag
Aufzuchtkälber: 10 g je Tier und Tag

*Die gleichzeitige orale Verwendung von Makroliden ist zu vermeiden
**enthält natürliche Antioxidantien (Phenole)

Lagerhinweis: Kühl und trocken lagern.

Kennzeichnung zur Berechnung der Stoffstrombilanz:
3,18 % N als Gesamtstickstoff, 0 % P₂O₅

Aanvullend diervoeder voor runderen

NL

Samenstelling: gist (inactieve *Saccharomyces cerevisiae*), graanbostel (gedroogd), sojaolie

Analytische bestanddelen en gehalten: ruwe proteïne 18,71 %, ruw vet 4,33 %, ruwe vezels 1,51 %, ruwe as 48,08 %, HCl-onoplosbaar as 40,15 %, natrium 0,05 %, fosfor 0 %

Additieven per kg: Darmflorastabilisatoren:
4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10⁹ kve
Stoffen ter reducering van besmetting van voermiddelen door mycotoxines: 1m558* bentoniet 500 000 mg
Aromastoffen: mengsel uit aromatische stoffen** 10 000 mg

Voerinstructie:

Melkkoeien: 20 g per dier en dag
Mestrunderen: 35 g per dier en dag
Opfokkalveren: 10 g per dier en dag

*Het gelijktijdige orale gebruik van macroliden moet vermeden worden
**bevat natuurlijke antioxidantien (fenolen)

Opslaginstructie: Koel en droog opslaan.

3,18 % N in zijn totaliteit, 0 % P₂O₅

Uzupełniająca mieszanka paszowa dla bydła

PL

Skład: drożdże (nieaktywne *Saccharomyces cerevisiae*), wywar zbożowy (suszony), olej sojowy

Składniki i ich zawartość: białko ogólne 18,71 %, tłuszcz surowy 4,33 %, włókno surowe 1,51 %, popiół surowy 48,08 %, popiół nierozpuszczalny w HCl 40,15 %, sól 0,05 %, fosfor 0 %

Dodatki na kg: Stabilizatory flory jelitowej:
4b1702 *Saccharomyces cerevisiae* (CNCM I-4407) 2000 x 10⁹ jtk
Dodatki zmniejszające zanieczyszczenie paszy mykotoksynami:
1m558* bentonit 500 000 mg
Substancje aromatyzujące: mieszanka aromatów** 10 000 mg

Dozowanie:

Krowy mleczne: 20 g/zwierzę/dzień
Bydło opasowe: 35 g/zwierzę/dzień
Odchow cieląt: 10 g/zwierzę/dzień

*Stosując orgacell sc mb nie należy jednocześnie podawać makrolidów
**zawiera naturalne przeciwutleniacze (fenole)

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

3,18 % N jako całkowity N, 0 % P₂O₅

pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich



Chargennr.: _____
Hersteldatum: _____
Mindestens haltbar bis: _____
Rezepturnummer: 202111/00769/04
Zulassungsnr. Hersteller: αDE Ni 400036
QS-ID: 4031735000511

Nettomasse:

20 kg

(batch / nr partii)
(productiedatum / data produkcji)
(ten minste houdbaar tot / data trwałości)
(product-nr. / nr produktu)
(registratienummer / nr zezwolenia)

(netto massa / masa netto)